


Consulta de EMERGENCIA-URGENCIA Odontológica





ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE URGENCIA PRESENCIAL

PERSONAL DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA:

Todo el personal debe tener el equipo de protección personal (EPP) completo
Programación de la cita individual y atención puntual.

PACIENTE Y ACOMPAÑANTES: Mantener distanciamiento social en áreas de espera mínimo 2 mts. Uso de mascarilla, Lavado de manos y cara.
El paciente debe entrar solo o máximo con un acompañante a la consulta

Utilice al máximo alternativas de tratamiento que no generen aerosoles

Desinfección de todas superficies y equipos con alcohol 70%, cloro 0,1% o desinfectante médico.
Unidad odontológica cercana a ventilación natural y luz solar, cubierta con papel film.

NO

Procedimiento que generará aerosol

SI

Bajo Riesgo: Odontólogo y auxiliares EPP básico descartable (máscara quirúrgica, lentes, pantalla facial, gorro, botas, bata cerrada, guantes)

Riesgo Moderado a alto: Odontólogo y auxiliares EPP específico descartable (**respirador N95***, lentes, pantalla facial, gorro, botas, bata cerrada, guantes)

Colocación del EPP en el siguiente orden: lavado de manos, botas, gorro, bata, respirador N95* o mascarilla quirúrgica, lentes, pantalla facial, guantes.

PACIENTE: Enjuagatorios o limpieza bucal con peróxido de hidrógeno al 1% o iodo povidona al 0,2%. Uso de barreras protectoras (gorro, lentes, campo según el caso).
El paciente debe mantener conducta colaboradora durante todo el procedimiento.

Derivar a paciente no colaborador para protocolo de sedación o anestesia general

Trabajo a 4 manos, con alta succión. Minimizar uso de equipo rotatorio. Utilizar dique de goma de ser posible. Mantener puerta del consultorio cerrada.

Al terminar tratamiento: desinfección del espacio aéreo con desinfectante en spray.
Retirar papel film de la unidad. Descartar desechos en contenedores apropiados. Limpieza de rotatorios (sumergir en agua jabonosa y activar por 2 minutos), limpieza de instrumental con jabón líquido y cloro, esterilización de todo el instrumental en autoclave.
Limpieza de todas las superficies radio de 2 mts de la unidad odontológica con alcohol 70%, cloro 0,1% o desinfectante médico.

Retiro del EPP en el siguiente orden: lavado de manos, pantalla facial, bata, higiene con gel alcoholado, lentes, mascarilla o respirador N95*, higiene con gel alcoholado, retiro de gorro, botas y guantes. Lavado de manos y cara después de cada procedimiento.

PACIENTE: Retiro de barreras. Salida del consultorio. Lavado de manos y cara.
Mantener distanciamiento social en áreas de externas mínimo 2 mts.

Seguimiento al paciente con telemedicina hasta culminado confinamiento

Ante la sospecha de contaminación o contacto con coronavirus, todo el personal presente durante la atención deberá guardar 14 días de cuarentena y realizarse pruebas diagnósticas